

皮膚障害対策シート

Fax 番号：052-991-8207

年 月 日 患者氏名 薬局名 薬剤師名

使用薬剤

☐ゲフィチニブ（イレッサ）☐エルロチニブ（タルセバ）☐アフアチニブ（ジオトリフ）☐オシメルチニブ（タグリッソ）

保湿剤の使用 有 ・ 無

	Grade1	Grade2	Grade3
ざ瘡様皮疹 ☐ なし	苦痛なし、紅色丘疹 <10%(体表面積)	痛み・痒みあり、紅色丘疹、膿疱 10~30%	激しい疼痛、灼熱感・びらん >30%
☐ 頭	外用ステロイド；very strong (アンテベートローション等)	外用ステロイド；very strong (アンテベートローション等) +ミノサイクリン内服 (50mg/回 朝夕)	外用ステロイド；very strong (アンテベートローション等) +ミノサイクリン内服 +ステロイド内服 (PSL10mg1週間)
☐ 顔	外用ステロイド；mild (ロコイド等)	外用ステロイド；strong (リンデロンV等) +ミノサイクリン内服 (50mg/回 朝夕)	外用ステロイド；very strong (マイザー、アンテベート等) +ミノサイクリン内服 +ステロイド内服 (PSL10mg1週間)
☐ 体幹	外用ステロイド；very strong (マイザー、アンテベート等)	外用ステロイド；very strong (マイザー、アンテベート等) +ミノサイクリン内服 (50mg/回 朝夕)	外用ステロイド；very strong (マイザー、アンテベート等) +ミノサイクリン内服 +ステロイド内服 (PSL10mg1週間)
乾皮症 (皮膚乾燥) ☐ なし ☐ 手 ☐ 足 ☐ 体幹	訴えなし 保湿剤； ヘパリン類似物質 尿素製剤、ワセリン	落屑・乾燥が顕著 かゆみ、亀裂 保湿剤 +外用ステロイド；strong または very strong (リンデロンV等またはマイザー等)	激しい痛み・かゆみ 日常生活に支障あり 保湿剤 +外用ステロイド；strong または very strong (リンデロンV等またはマイザー等)
爪囲炎 ☐ なし ☐ 手 ☐ 足	発赤、腫脹 疼痛なし 洗浄+保湿剤+テーピング +外用ステロイド；very strong (マイザー、アンテベート等)	発赤、腫脹 肉芽形成 疼痛あり 洗浄+保湿剤+テーピング +外用ステロイド；strongest(デルモベート等) +ミノマイシン内服	発赤、腫脹が顕著 強い疼痛にて日常生活に支障がある (歩行困難、手作業ができない等) Grade2の処置 外科的処置
手足症候群 ☐ なし ☐ 手 ☐ 足	疼痛なし 紅斑、浮腫み 角質増殖、爪の変形 保湿剤 +外用ステロイド；very strong (マイザー、アンテベート等)	疼痛を伴う皮膚の変化 角質剥離、水疱、出血、浮腫み 日常生活に支障あり (食事の準備、電話の使用、着衣、歩行等に影響) 保湿剤 +外用ステロイド；very strong または strongest (マイザー、アンテベート等またはデルモベート等)	疼痛を伴う高度な皮膚の変化 角質剥離、水疱、出血、浮腫み 日常生活に支障あり (入浴、着衣、食事、薬の内服、歩行し辛い等、身の回りの動作が困難) 保湿剤 +外用ステロイド；strongest (デルモベート等) 重篤な場合、ステロイド全身投与

() 内は症状が改善しない、あるいは増悪傾向の場合に考慮
該当箇所を○で囲んでください 例) ざ瘡様皮疹 紅色丘疹 苦痛なし <10%(体表面積) 外用ステロイド；顔：ロコイド
※この用紙は疑義の有無に関わらず名古屋市立西部医療センターまで必ず Fax したのち、破棄してください。