

年 月 日 患者氏名 薬局名 薬剤師名

使用薬剤

☐カペシタビン（ゼローダ）☐レゴラフェニブ（スチバーガ）☒ゲフィチニブ（イレッサ）☐エルロチニブ（タルセバ）☐アファチニブ（ジオトリフ）☐オシメルチニブ（タグリッソ）☐アキシチニブ（インライタ）☐スニチニブ（スーテント）☐ソラフェニブ（ネクサバル）☐エベロリムス（アブリシア）☐ニボルマブ（オプネヴィ）☐ペムメット（ペムメット）☐アテゾニブ（テムザ）☐ダスチニブ（ダスチニブ）☐セキナメキニブ（セキナメキニブ）☐ニボルマブ（オプネヴィ）☐ペムメット（ペムメット）☐アテゾニブ（テムザ）☐ダスチニブ（ダスチニブ）☐セキナメキニブ（セキナメキニブ）

使用薬剤にチェック

保湿剤の使用 ☒有 ☐無

保湿剤を持っても使用していない場合は無に〇、使用するよう指導してください。

	Grade1	Grade2	Grade3
ざ瘡様皮疹 ☐ なし	苦痛なし、 <u>紅色丘疹</u> <10%(体表面積)	<u>痛み・痒みあり</u> 、 <u>紅色丘疹</u> 、膿疱 <u>10~30%</u>	激しい痒み >30%
☒ 頭	外用ステロイド；very strong (アンテベートローション等)	外用ステロイド；very strong (アンテベートローション等) +ミノサイクリン内服 (50mg/回 朝夕)	外用ステロイド；very strong (アンテベートローション等) +ミノサイクリン内服 +ステロイド内服 (PSL10mg1週間)
☒ 顔	外用ステロイド； <u>mild</u> (ロコイド等)	外用ステロイド；strong (リンデロンV等) +ミノサイクリン内服 (50mg/回 朝夕)	外用ステロイド；very strong (マイザー、アンテベート等) +ミノサイクリン内服 +ステロイド内服 (PSL10mg1週間)
☒ 体幹	外用ステロイド；very strong (マイザー、アンテベート等)	外用ステロイド； <u>very strong</u> (マイザー、アンテベート等)	外用ステロイド；very strong (マイザー、アンテベート等) +ミノサイクリン内服 +ステロイド内服 (PSL10mg1週間)
乾皮症 (皮膚乾燥) ☐ なし ☒ 手 ☒ 足 ☒ 体幹	<u>訴えなし</u> (体幹) 保湿剤； ヘパリン類似物質 尿素製剤、ワセリン	<u>落屑・乾燥が顕著</u> (手足) <u>かゆみ</u> 、 <u>亀裂</u> 保湿剤 +外用ス	激しい痒み 日常生活に支障あり 保湿剤 +外用ステロイド；strong または very strong (リンデロンV等またはマイザー等)
爪囲炎 ☐ なし ☒ 手 ☒ 足	<u>発赤、腫脹</u> (手) <u>疼痛なし</u> 洗浄+保湿剤+テーピング +外用ステロイド；very strong (マイザー、アンテベート等)	<u>発赤、腫脹</u> (足) <u>肉芽形成</u> <u>疼痛あり</u> 洗浄+保湿剤+テーピング +外用ステロイド； <u>strongest(デルモベート等)</u> +ミノマイシン内服	発赤、腫脹、強い疼痛に (歩行困難、日常生活に支障あり) Grade2の処置 外科的処置
手足症候群 ☒ なし ☐ 手 ☐ 足	疼痛なし 紅斑、浮腫み 副作用がない場合はここにチェック	疼痛を伴う高度な角質剥離、水疱、日常生活に支障あり 副作用はないので囲みは不要	疼痛を伴う高度な角質剥離、水疱、日常生活に支障あり (入浴、着衣、食事、薬の内服、歩行し辛い等、身の回りの動作が困難) 該当する副作用がない場合
	保湿剤 +外用ステロイド；very strong (マイザー、アンテベート等)	保湿剤 +外用ステロイド；very strong または strongest (マイザー、アンテベート等またはデルモベート等)	保湿剤 +外用ステロイド；strongest (デルモベート等) 重篤な場合、ステロイド全身投与

() 内は症状が改善しない、あるいは増悪傾向の場合に考慮
該当箇所を○で囲んでください 例) ざ瘡様皮疹、紅色丘疹、苦痛なし <10%(体表面積) 外用ステロイド；顔：ロコイド
※この用紙は疑義の有無に関わらず〇〇〇〇病院まで必ず Fax したのち、破棄してください。