




【S-1+CPT-11 療法について】 (S-1+イリノテカン)



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
S-1錠 (エヌケーエスワン)	抗がん剤です	朝・夕 内服		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																	
パロノセトロン注 (アロキシ) デキサメタゾン注 (デキサート)	吐き気止めです	15分																									この週はお休みです。									
イリノテカン注	抗がん剤です	90分																																		
生理食塩液		15分																																		



😊 治療による副作用

📅 : 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
自覚症状	過敏症																												
		痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																											
	食欲不振・吐き気																												
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																											
	皮疹																												
		皮膚に痒みや発赤などの症状が出た場合はお知らせ下さい。																											
	下痢																												
検査値		便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水のような便が出るときはお知らせ下さい。																											
	口内炎																												
		口の中が荒れて痛みが出る場合があります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																											
	色素沈着																												
		肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																											
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																												
		髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																											
検査値	白血球減少																												
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																											
	赤血球減少(貧血)																												
検査値		貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																											
	血小板減少																												
		出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																											



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使い下さい。

名古屋市立西部医療センター薬剤科(代表)052-991-8121