



【GEM3投1休(肺) 療法について】 (ゲムシタビン)



お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
デキサメタゾン注 (デキサート)	吐き気止めです	15分																												
ゲムシタビン注	抗がん剤です	30分																												
生理食塩液		15分																												



この週は
お休みです。



治療による副作用

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
自覚症状	発熱																												
		悪寒、発熱があるときはお知らせください。																											
	食欲不振・吐き気																												
検査値	血管痛・静脈炎																												
		点滴の途中に、注射部分やその周りに違和感や痛みなどがあればお知らせください。																											
	白血球減少																												
検査値	赤血球減少(貧血)																												
		貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																											
	血小板減少																												
検査値	肝機能低下																												
		体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。																											



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使い下さい。
名古屋市立西部医療センター薬剤科(代表)052-991-8121