



【PTX(80)毎週+HER3週毎(乳腺) 療法について】



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ジフェンヒドラミン錠 (レスタミン)	過敏症を抑えるお薬です	1日1回 内服	○ 5錠							○ 5錠							○ 5錠						
グラニセトン注	吐き気止めです	30分																					
ファモチジン注 (ガスター)	過敏症を抑えるお薬です (デキサート)		💧							💧							💧						
デキサメタゾン注 (デキサート)			デキサメタゾン注には、吐き気止め																				
トラスツズマブ注 (ハーセプチン)	抗がん剤です	90分	💧							💧							💧						
パクリタキセル注	抗がん剤です	60分	💧							💧							💧						
生理食塩液		15分	💧							💧							💧						

😊 治療による副作用

📅 : 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
自覚症状	アレルギー様症状																					
	過敏症																					
	食欲不振・吐き気																					
	関節痛・筋肉痛																					
	口内炎																					
	手足のしびれ																					
	脱毛(頭髮・まつ毛・眉毛など)																					
検査値	白血球減少																					
	赤血球減少(貧血)																					
	血小板減少																					

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使い下さい。
名古屋市立西部医療センター薬剤科(代表)052-991-8121