



【AC 療法について】 (ドキシソリン+シクロホスファミド)



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アプレピタントカプセル(イメンド)	吐き気止めです	1日1回 内服				1日目は、抗がん剤の投与開始 60～90分前 に飲んでください。 2～3日目は 午前中 に飲んで下さい。																	
パロノセトロン注(アロキシ)	吐き気止めです	15分																					
デキサメタゾン注(デキサート)																							
ドキシソリン注	抗がん剤です	5分		尿の色が赤くなる場合があります。																			
シクロホスファミド注(エンドキサン)	抗がん剤です	30分																					
生理食塩液		15分																					

😊 治療による副作用

：注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
自覚症状	食欲不振・吐き気																				
	食欲低下や吐き気がする場合があります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																				
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																				
	排尿時の不快感、尿に血が混ざるなどの症状があるときはお知らせください。																				
	口内炎																				
検査値	口の中が荒れて痛みが出る場合があります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行きましょう。																				
	色素沈着																				
	肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																				
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																				
	髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																				
検査値	白血球減少																				
	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																				
	赤血球減少(貧血)																				
検査値	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																				
	血小板減少																				
	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																				

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



* 感染症や口内炎を防ぐために、口の中を清潔に保つ必要があります。うがいを行って下さい。
* 37.5度以上の発熱がある場合は、**抗生剤(レボフロキサシン)**を内服して下さい。内服を開始したら1週間継続して服用して下さい。症状が数日経っても改善しない場合は、すぐに主治医に連絡して下さい。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使い下さい
名古屋市立西部医療センター薬剤科(代表)052-991-8121