



【エリブリン療法について】



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール**（副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	作用	時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
生理食塩液	ルートの確保と洗い流し用です。																						
エリブリン注（ハラヴェン）	抗がん剤です	約5分																					



この週はお休みです。

😊 治療による副作用

：注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
自覚症状	アレルギー様症状																					
		発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																				
	食欲不振・吐き気																					
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																				
	口内炎																					
検査値	手足のしびれ																					
		口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																				
	手足のしびれ																					
		手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																				
	脱毛（頭髪・まつ毛・眉毛など）																					
検査値		髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																				
	白血球減少																					
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																				
	赤血球減少（貧血）																					
検査値		貧血の症状（めまい・ふらつき）がでたりします。転倒に注意しましょう。																				
	血小板減少																					
検査値		出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																				



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。