



【S-1+CBDCA 療法について】

(S-1+カルボプラチン)



お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
S-1錠 (エヌケーエスワン)	抗がん剤です	朝・夕 内服																					
アプレピタントカプセル (イメンド)	吐き気止めです	1日1回 内服				1日目は、抗がん剤の投与開始 60～90分前 に飲んでください。 2～3日目は 午前中 に飲んで下さい。																	
グラニセトン注 デキサメタゾン注 (デキサート)	吐き気止めです	15分																					
カルボプラチン注	抗がん剤です	1時間30分																					
生理食塩液		15分																					



この週は
お休みです。



治療による副作用

副作用が出やすい時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
自覚症状	食欲不振・吐き気																					
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																				
	皮疹																					
		皮膚に痒みや発赤などの症状が出た場合はお知らせ下さい。																				
	下痢																					
		便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。																				
検査値	口内炎																					
		口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																				
	色素沈着																					
		肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																				
	流涙(涙目、涙が出る)																					
		涙が止まらない、目が痛い、目がかすむ、物が見えにくい等があるときはお知らせ下さい。																				
	白血球減少																					
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																				
	赤血球減少(貧血)																					
		貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																				
	血小板減少																					
		出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																				

上記以外の症状でも気になる症状がありましたらお知らせ下さい。



- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使い下さい。

名古屋市立西部医療センター薬剤科(代表)052-991-8121