



【PTX(80)毎週 療法について】 (パクリタキセル)



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ジフェンヒドラミン錠 (レスタミン)	過敏症を抑えるお薬です	1日1回 内服	○	5錠						○	5錠						○	5錠						○	5錠						
グラニセトロン注	吐き気止めです	30分		眠気がでることがあります。																											
ファモチジン注 (ガスター)	過敏症を抑えるお薬です			デキサート注には、吐き気止め																											
デキサメタゾン注 (デキサート)																															
パクリタキセル注	抗がん剤です	60分																													
生理食塩液		15分																													

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
	過敏症																																					
		痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																																				
	食欲不振・吐き気																																					
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																																				
	関節痛・筋肉痛																																					
		肩や背中、腰や腕などの筋肉が痛くなったり、関節が痛くなることがあります。																																				
	口内炎																																					
		口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																																				
	手足のしびれ																																					
		手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																																				
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																					
		髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																																				
検査値	白血球減少																																					
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																																				
	赤血球減少(貧血)																																					
		貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																																				
	血小板減少																																					
		出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																																				



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使い下さい。
名古屋市立西部医療センター薬剤科(代表)052-991-8121